



Trimet®

Fungicida agrícola

Polvo humectable

Producto registrado

COMPOSICION PORCENTUAL: **Porcentaje
en peso**

Ingrediente activo:

Sulfato tribásico de cobre monohidratado
(con un contenido de cobre metálico
como elemento no menor de 54 %)

No menos de:92.60 %

(Equivalente a 500 g de I.A./kg)

Ingredientes inertes:

Diluyente, humectante y dispersante

No más de:7.40 %

Total:100.00 %

ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS: TRIMET® (sulfato tribásico de cobre) es un producto ligeramente tóxico para seres de sangre caliente, por lo que deberá evitarse su ingestión así como el contacto con la piel y ojos. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa y forrajes.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No almacenar en casas habitación. No deben exponerse ni manejar el producto mujeres embarazadas, en lactación ni personas menores de 18 años. No se reutilice el envase, destrúyase.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LIGERAMENTE TOXICO

INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

INFORMACION GENERAL: TRIMET® es un fungicida cúprico a base de sulfato tribásico de cobre que actúa por contacto para el control de las enfermedades fungosas que se indican más adelante.

CONTRAINDICACIONES: No se aplique en las horas de calor ni cuando el viento sea fuerte.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico por sí solo si se aplica en los cultivos, dosis y recomendaciones aquí indicadas.

En caso de mezclarse con otros productos, deberá hacerse una prueba previa para evitar toxicidad.

INCOMPATIBILIDAD: TRIMET® no es compatible con thiram y diazinón.

No debe mezclarse con cal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones del producto.

Use el equipo de protección adecuado y completo.

Mezcle los preparativos con un removedor nunca con las manos, aunque tenga los guantes puestos.

No coma, beba o fume durante las aplicaciones.

No se aplique contra el viento.

No use la boca para transvasar TRIMET® ni sople boquillas de aspersión obturadas.

Después de un día de trabajo, lave perfectamente el equipo de aplicación, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

EN CASO DE INTOXICACION

LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Si ocurre contacto con la piel u ojos, lávese la parte afectada con abundante agua corriente limpia.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoquelo el vómito introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada.

Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

Síntomas de intoxicación: TRIMET® es un fungicida a base de sulfato tribásico de cobre. Los síntomas de intoxicación son dermatitis al contacto continuo con la piel. Por ingestión se presenta sensación dolorosa de quemadura en la boca y esófago, diarrea, vómito, anuria, lesión hepática y convulsiones.

Tratamiento: No se conoce antídoto específico, por lo que el tratamiento médico es esencialmente sintomático.

Efectuar un lavado de estómago con carbón activado medicinal (de 3 a 5 cucharadas en medio litro de agua).

Mantenga al paciente en observación médica durante 48 horas por lo menos.

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: No contamine con este producto el agua de arroyos, lagunas, presas, ríos, estanques, abrevaderos, vertiendo en ella sobrantes o al lavar el equipo de aplicación.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de productos alimenticios, ropa y forrajes. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en sus envases originales.

GARANTIA: Debido a que el clima, cultivo, suelo y condiciones de aplicación pueden variar, Cuprosa, S.A. de C.V., y/o el distribuidor no ofrecen garantía de ninguna especie, expresa o implícita concerniente al uso o comportamiento del producto. El usuario asume todos los riesgos de manejo del producto, estén o no de acuerdo con las instrucciones de uso. Solamente se garantiza la composición correcta y el contenido neto del envase.

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUI MENCIONADOS

Cultivo	Nombre común	Nombre científico	Dosis (g/100 L de agua/ha)	* Sin límite
Apio	Mancha foliar Tizón foliar	<i>Cercospora apii</i> <i>Septoria apii</i>	750	
Cafeto	Ojo de gallo Mal de hilacha	<i>Mycena citricolor</i> <i>Corticium koleroga</i>	500	
Calabaza	Cenicilla polvorienta	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	500	
Chile	Antracnosis	<i>Colletotrichum capsici</i>	500	
Ciruelo	Verrucosis Tiro de munición	<i>Thaphrina pruni</i> <i>Coryneum beijerinckii</i>	750	
Cítricos	Roña Antracnosis Melanosis Fumagina	<i>Elsinoe fawcetti</i> <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> <i>Diaporthe citri</i> <i>Capnodium spp</i>	750	
Col, brócoli y coliflor	Mildiú	<i>Peronospora parasitica</i>	750	
Durazno	Tiro de munición Verrucosis	<i>Coryneum beijerinckii</i> <i>Taphrina deformans</i>	750	

Fresa	Peca de la hoja Quemadura de la hoja Moho gris	<i>Mycosphaerella fragariae</i> <i>Diplocarpon earliana</i> <i>Botrytis cinerea</i>	2.8 kg/100 L de agua	
Frijol	Antracnosis	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	750	
Guayabo	Antracnosis	<i>Gloeosporium psidii</i>	750	
Henequén	Antracnosis	<i>Colletotrichum spp</i>	750	*Sin límite entre la última aplicación y la cosecha
Jitomate	Antracnosis Tizón temprano Tizón tardío	<i>Colletotrichum phomoides</i> <i>Alternaria solani</i> <i>Phytophthora infestans</i>	750	
Mango	Fumagina	<i>Capnodium spp</i>	750	
Manzano	Roña o sarna Tizón de fuego	<i>Ventura inaequalis</i> <i>Erwinia amylovora</i>	500	
Peral	Roña o sarna Tizón de fuego	<i>Ventura pirina</i> <i>Erwinia amylovora</i>	500	
Melón	Cenicilla polvorienta Mildiú Antracnosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Pseudoperonospora cubensis</i> <i>Colletotrichum lagenarium</i>	500	
Ornamentales	Mancha negra	<i>Diplocarpon rosae</i>	750	
Papa	Tizón temprano Tizón tardío Mancha gris	<i>Alternaria solani</i> <i>Phytophthora infestans</i> <i>Stemphylium solani</i>	1.0 kg/100 L de agua	
Plátano	Chamusco	<i>Mycosphaerella musicola</i>	750	
Pepino	Cenicilla Mildiú Antracnosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	500	

		<i>Colletotrichum lagenarium</i>		
Remolacha	Mancha foliar	<i>Cercospora spp</i>	500	
Sandía	Cenicilla Mildiú Antracnosis	<i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Pseudoperonospora cubensis</i> <i>Colletotrichum lagenarium</i>	500	
Soya	Mildiú	<i>Peronospora manshurica</i>	750	
Vid	Mildiú	<i>Plamospora viticola</i>	750	

Cuprosa, S.A. de C.V.

Calle 4 Núm. 2734 - Zona Industrial - 44940 Guadalajara, Jalisco México - Tels.: (33) 3645-7005 y 3645-8793 Fax: (33) 3810-2491 - e-mail: info@cuprosa.com.mx - www.cuprosa.com.mx