



LESTER® 7 CE

Insecticida agrícola

Concentrado emulsionable

Producto registrado: **RSCO-INAC-0177-0693-009-6.53**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

LAMBDA CYHALOTRINA: (R)- α -Ciano-3-fenoxibencil

(1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato y
(S)- α -ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetil
ciclopropano carboxilato.

6.53

(Equivalente a 60 g i.a./L a 20 °C)

INGREDIENTES INERTES:

Emulsificantes, diluyente, disolvente, impurezas y compuestos relacionados.

93.47

TOTAL

100.00



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4, **PRECUACIÓN. BANDA AZUL**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

LESTER® 7 CE es un insecticida piretroide recomendado para el control de las plagas indicadas en el siguiente cuadro.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Aguacatero (14)*	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	400-500 ml/ha	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 950 -1050 L de agua/ha.
Jitomate (5)	Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>)	0.4-0.5	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 370 - 470 L de agua /ha
Maíz (15)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.25-0.30	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 550 – 650 L de agua/ha.
Ajo (14) Cebolla (14) Cebollín (14)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	0.5-0.75	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 5 días, iniciar las aplicaciones cuando se detecte la presencia de la plaga distribuida homogéneamente en el cultivo, adicionar un coadyuvante a dosis recomendada en su etiqueta; volumen de aplicación 350 – 450 L de agua/ha.
Brócoli (1) Col (1) Col de Bruselas (1)	Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	0.4-0.6	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se observen

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Coliflor (1)			los primeros individuos de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 350 – 450 L de agua/ha.
Soya (15)	Gusano terciopelo (<i>Anticarsia gemmatilis</i>)	0.5-0.7	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 370 – 470 L de agua/ha.
Chile (5) Berenjena (5) Jitomate (5) Okra (5) Papa (5) Pimiento morrón (5) Tomate verde (5)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	400 - 600 ml/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga con distribución homogénea en el cultivo, periodo de protección por al menos 14 días; volumen de aplicación 460 – 560 L de agua/ha.
Pepino (1) Calabacita (1) Calabaza (1) Chayote (1) Melón (1) Sandía (1)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	500-700 ml/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 10 días, cuando se detecte la presencia de la plaga, periodo de protección por al menos 17 días; volumen de aplicación 350 – 450 L de agua/ha.
Melón (1) Calabacita (1) Calabaza (1) Chayote (1) Pepino (1) Sandía (1)	Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	500-700 ml/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga con una distribución homogénea dentro del cultivo, periodo de protección hasta 14 días; volumen de aplicación 460 – 560 L de agua/ha.

*(): Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 6 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Aguacatero	0.20	EPA*
Jitomate	0.05	
Maíz	0.10	
Ajo	0.02	UNIÓN EUROPEA
Cebolla		
Cebollín		
Brócoli	0.4	EPA
Col	0.2	UNIÓN EUROPEA
Col de Bruselas	0.2	
Coliflor	0.1	
Soya	0.01	EPA
Chile	0.5	UNIÓN EUROPEA
Berenjena	0.5	
Jitomate	0.1	
Okra	0.20	EPA
Papa	0.02	UNIÓN EUROPEA
Pimiento Morrón	0.1	
Tomate Verde	0.01	
Pepino	0.1	
Calabacita	0.1	
Calabaza	0.1	
Chayote	0.05	
Melón	0.05	
Sandía	0.05	

*Environmental Protection Agency



MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Con el equipo de protección puesto (gorra de algodón, o sombrero; mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio; careta, o gafas de seguridad, o lentes de seguridad, overol de algodón, guantes y botas de neopreno), abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare. Para disminuir la deriva y el riesgo de inhalación del producto al momento de hacer las aplicaciones en campo, se recomienda usar las boquillas TX-2, TX-3, TX-4, TX-6 de cono hueco.

CONTRAINDICACIONES.

No se aplique en horas de calor intenso, no aplicar con vientos con velocidad superior a 8 km/hora.

FITOTOXICIDAD: este producto no es fitotóxico para los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.